

There are no translations available.

Переклад з російської: Стрілецька М.В.

Друзі та вороги (сумісність та несумісність рослин на городі)

Як відомо, сусідство рослин може бути сприятливим або шкідливим. Наприклад, огірки дружать з горохом, капустою, але ворогують з картоплею і ароматичними травами. Капуста білокачанна у якості сусідів віддає перевагу кропу, селері, цибулі, салату, картоплі і неполюбляє помідори і столову квасолю. А з якими овочами дружить морква? З помідорами і горохом. Картопля добре уживається з квасолею, кукурудзою, капустою, хрінном, баклажаном і цибулею, але не терпить помідора, огірка і гарбуза. Друзі редьки - буряк, шпинат, морква, пастернак, огірок, гарбуз і томат, а недруг - ісоп. Деякі овочі - ісоп, фенхель - не терплять сусідства з багатьма рослинами, і їх краще вирощувати на окремій гряді.

Інший важливий критерій при підборі компонентів для змішаних посівів - здатність деяких рослин відлякувати шкідливих комах. Так, цибуля діє на павутинового кліщика, махорка на капустяну муху, часник і полин на хрестоцвітних блішок, помідори на медяницю і огнівку. Запах селери відлякує капустяну муху.

Борються з шкідливими комахами і за допомогою диких рослин. Для цього городники використовують настої. Наприклад, препарат з суцвіття ромашки відлякує і навіть губить багато шкідників саду і городу. Для приготування препарату суцвіття ромашок збирають і висушують. Після чого їх розмелюють в тонкий порошок, змішують з рівною кількістю дорожнього пилу (бажано зібраною не поблизу від промислових підприємств і жвавих автомагістралей). Для обприскування беруть 200 г порошку, розмішують у малій кількості води і доливають водою до норми (10 л).

Цей препарат абсолютно нешкідливий, і їм можна обробляти культури навіть перед самим збиранням врожаю.

Проти тлі і павутинового кліща, які шкодять огіркам і капусті, рослини обприскують настоем картоплиння (картопляного бадилля). Для цього 1,2 кг подрібненої зеленої маси настоюють 2-3 години в 10 л води і проціджують. З цією ж метою можна використовувати відвар пасинків і бадилля помідорів. При цьому беруть зеленої маси в розрахунку 40 г на 1 л води і, подрібнивши, кип'ятять на повільному вогні 30 хв. Один стакан отриманого таким чином відвару вистачить на 1 л води. У готовий відвар додають 30 г мила або прального порошку і обприскують рослини. Проти тлі і кліща допомагають ще настої з цибульного лушпиння, ромашки, тютюну, часнику, деревію, коріння кінського щавлю і листя кульбаби. Приведемо декілька варіантів змішаних і ущільнених посівів городних культур, які і рекомендуємо випробувати на своїй ділянці.

Помідори, шпинат в цьому варіанті сприятливо впливають на інші культури. На гряді шириною 1 м в серпні висаджують суницю в два ряди на відстані 50 см, між ними навесні наступного року сіють овочі.

Посередині гряди в один ряд висівають кріп і через 1 м в ряду висаджують по одній

Друзі та вороги (сумісність та несумісність рослин на городі)

Sunday, 11 April 2010 16:39 - Last Updated Wednesday, 02 March 2011 15:28

рослині помідора. Зліва від цього ряду висівають крес-салат (один ряд), а справа - шпинат (теж один ряд), на краях гряди - петрушку і чабер однорічний. Першим дає продукцію крес-салат, потім - шпинат і кріп. Після цього овочеві рослини, які залишилися, починають швидко розвиватися. Чабер використовують в їжу як в свіжому, так і в сушеному вигляді, тому прибирають його в міру необхідності. Восени зрізують зелень, що залишилася, для сушки.





Сумісне вирощування суниці, помідора, шпинату, крес-салату, кропу, петрушки і чаберу

Ці овочі добре сумісні. Вирощують їх на гряді шириною 1 м. Розміщують 3 ряди кольрабі поперемінно з качановим салатом по схемі 33 x 25 см. Між ними можна висівати 2 рядки шпинату. На краях грядки розводять ще по одному рядку листового салату поперемінно з невеликою кількістю редиски (одне насіннячко через 10 см). При такій комбінації листовий салат допомагає знищувати хрестоцвітних блішок на кольрабі і редисці. Першими прибирають шпинат і редиску, потім дозрівають перші качанчики салату. З прибиранням листового салату можна небагато почекати. В останню чергу прибирають кольрабі.





«Дружать» качановий і листовий салати, кольрабі, редиска і шпинат

У цій суміші 5 рядків цибулі висівають на відстані 15 см один від одного. У рядку між рослинами цибулі висівають декілька насіння редиски. Потім висівають чергуючими рядками 2 ряди моркви і 2 ряди петрушки. Всі культури уживаються добре. Після вбирання врожаю дві сусідніх культури (спершу редиски, потім цибулі) петрушка і морква, які залишилися, ростуть на всій гряді і до кінця літа дають нормально розвинені коренеплоди.




Друзі та вороги (сумісність та несумісність рослин на городі)

Sunday, 11 April 2010 16:39 - Last Updated Wednesday, 02 March 2011 15:28




Друзі та вороги (сумісність та несумісність рослин на городі)

Sunday, 11 April 2010 16:39 - Last Updated Wednesday, 02 March 2011 15:28



Друзі та вороги (сумісність та несумісність рослин на городі)

Sunday, 11 April 2010 16:39 - Last Updated Wednesday, 02 March 2011 15:28





Розмір шрифта: 12pt. Колір шрифта: чорний. Рівняння: лінійне. Шрифт: Arial. Розмір шрифта: 12pt. Колір шрифта: чорний. Рівняння: лінійне. Шрифт: Arial.

Розмір шрифта: 12pt. Колір шрифта: чорний. Рівняння: лінійне. Шрифт: Arial. Розмір шрифта: 12pt. Колір шрифта: чорний. Рівняння: лінійне. Шрифт: Arial.

У разі коментарів в електронній пошті, будь ласка, повідомити про це на сторінці [реєстрації](#) за